

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Руководителя
Россельхознадзора



Н. А. ВЛАСОВ
24.10.2018

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата *УльтраСелл-Дог*
(*UltraCell-Dog*)

(Организация-разработчик: ООО «НОВИСТЕМ», 115419, г. Москва, 2-й
Роцинский проезд, д.8, стр.5)

Номер регистрационного удостоверения 74-3-6.18-4290/17ВР-3-6.18/03435

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: *УльтраСелл-Дог*
(*UltraCell-Dog*).

Группировочное наименование лекарственного препарата: белково-пептидный комплекс, полученный из кондиционной среды при культивировании мезенхимальных стволовых клеток собаки.

2. Лекарственная форма: лиофилизат для приготовления раствора для инъекций.

Препарат *УльтраСелл-Дог* (*UltraCell-Dog*) в качестве действующего вещества содержит белково-пептидный комплекс, полученный из кондиционной среды при культивировании мезенхимальных стволовых клеток собаки, 0,4 мг во флаконе и вспомогательное вещество – глицин.

3. *УльтраСелл-Дог* (*UltraCell-Dog*) по внешнему виду представляет собой пористую массу или порошок белого цвета с розоватым или желтоватым оттенком.

Срок годности лекарственного препарата в закрытой упаковке производителя при соблюдении условий хранения и транспортирования – 12 месяцев с даты производства. После вскрытия флакона препарат хранению не подлежит.

Запрещается применять *УльтраСелл-Дог* (*UltraCell-Dog*) по истечении срока годности.

4. Выпускают препарат в виде стерильной лиофилизированной массы (порошка), расфасованным в стеклянные флаконы вместимостью 2 мл, закупоренные пробками резиновыми, обкатанные колпачками комбинированными, которые упаковывают в картонные пачки по 5 штук вместе с инструкцией по применению.

5. УльтраСелл-Дог (UltraCell-Dog) следует хранить в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 2 до 8 °С.

6. Лекарственный препарат УльтраСелл-Дог (UltraCell-Dog) следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Не использованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: УльтраСелл-Дог (UltraCell-Dog) отпускают без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические (биологические) свойства

9. УльтраСелл-Дог (UltraCell-Dog) относится к стимуляторам регенерации тканей.

10. Активная фармацевтическая субстанция УльтраСелл-Дог (UltraCell-Dog) представляет собой белково-пептидный комплекс, полученный из кондиционной среды при культивировании мезенхимальных стволовых клеток собаки. Входящие в состав белково-пептидного комплекса низкомолекулярные пептиды с молекулярной массой до 10 кДа оказывают регенерирующее и репаративное действие, стимулируя восстановление поврежденных тканей за счет активизации систем клеточного обновления организма, обеспечивая замещение поврежденных клеток.

Препарат УльтраСелл-Дог (UltraCell-Dog) относится к малоопасным веществам и в рекомендуемых дозах не вызывает местно-раздражающего, эмбриотоксического и тератогенного действия.

III. Порядок применения

11. УльтраСелл-Дог (UltraCell-Dog) применяют при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата (травмы связок конечностей, остеоартроз), поражений кожи неинфекционной этиологии, асептических ранах, а также в комплексной терапии указанных заболеваний, осложненных инфекцией.

12. Противопоказанием к применению препарата УльтраСелл-Дог (UltraCell-Dog), является повышенная чувствительность животного к компонентам препарата, аутоиммунные и онкологические заболевания.

13. При проведении лечебных мероприятий, с использованием препарата УльтраСелл-Дог (UltraCell-Dog), следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо немедленно промыть большим количеством проточной воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом УльтраСелл-Дог (UltraCell-Dog). В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Особенности применения препарата беременным и лактирующим самкам, а также новорожденным животным не установлено. Тем не менее, этим группам животных препарат следует применять с осторожностью, по строгим показаниям и под контролем ветеринарного врача.

15. Перед применением содержимое флакона растворяют в 1 мл стерильного 0,9 %-го раствора натрия хлорида (в комплект не входит) и нагревают в руке. При растворении препарата не следует сильно встряхивать ампулу во избежание пенообразования.

УльтраСелл-Дог (UltraCell-Dog) вводят собакам внутримышечно или подкожно 1 раз в сутки в течение 5 дней. В случае необходимости курс лечения можно повторить через 30-45 дней. Собакам с массой тела до 10 кг и щенкам крупных пород до 6 месяцев вводят 0,2 мг препарата, животным с массой тела более 10 кг и старше 6 месяцев применяют 0,4 мг.

16. При применении лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. В редких случаях на месте инъекции возможны гиперемия, развитие отека, который рассасывается самопроизвольно в течение нескольких суток.

При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата и возникновении аллергических реакций, использование УльтраСелл-Дог (UltraCell-Dog) прекращают и проводят десенсибилизирующую терапию.

17. Симптомов передозировки при применении УльтраСелл-Дог (UltraCell-Dog) не установлено.

18. Информация о несовместимости препарата УльтраСелл-Дог (UltraCell-Dog) с известными кормовыми добавками и лекарственными препаратами других фармакологических групп отсутствует.

19. Особенности действия при первом приеме препарата УльтраСелл-Дог (UltraCell-Dog) или при его отмене не выявлено.

20. Следует избегать пропусков при введении очередной дозы препарата УльтраСелл-Дог (UltraCell-Dog), так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы необходимо ввести ее как можно скорее, далее интервал между введения препарата не изменяется.

21. Препарат не предназначен для применения продуктивным животным.

Наименование и адрес производственной площадки производителя препарата для ветеринарного применения.	ООО «НОВИСТЕМ» (ООО «NoviStem»), 308017, г. Белгород, ул. Константина Заслонова, 199 Б.
--	---

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя	ООО «НОВИСТЕМ» (ООО «NoviStem»), 115419, г. Москва, 2-й Рощинский проезд, д.8, стр.5.
--	---