

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Руководителя
Россельхознадзора



Н.А. ВЛАСОВ
04.02.2019

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата *УльтраСелл-Кэт*
(*UltraCell-Cat*)

(Организация-разработчик: ООО «НОВИСТЕМ», 115419, г. Москва, 2-й
Роцинский проезд, д.8, стр.5)

Номер регистрационного удостоверения 44-3-1.19-4411/17ВР-3-1.19/03460

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:

торговое наименование – УльтраСелл-Кэт (UltraCell-Cat).

группировочное наименование – белково-пептидный комплекс, полученный из кондиционной среды при культивировании мезенхимальных стволовых клеток кошки.

2. Лекарственная форма: лиофилизат для приготовления раствора для инъекций.

Препарат УльтраСелл-Кэт (UltraCell-Cat) в качестве действующего вещества содержит белково-пептидный комплекс, полученный из кондиционной среды при культивировании мезенхимальных стволовых клеток кошки, 0,4 мг во флаконе, и вспомогательное вещество – глицин.

3. УльтраСелл-Кэт (UltraCell-Cat) по внешнему виду представляет собой пористую массу или порошок белого цвета с розоватым или желтоватым оттенком.

Срок годности лекарственного препарата в закрытой упаковке производителя при соблюдении условий хранения и транспортирования – 12 месяцев с даты производства. После вскрытия флакона препарат хранению не подлежит.

Запрещается применять УльтраСелл-Кэт (UltraCell-Cat) по истечении срока годности.

4. Выпускают препарат в виде стерильной лиофилизированной массы (порошка), расфасованным в стеклянные флаконы вместимостью 2 мл, закупоренные пробками резиновыми, обкатанные колпачками комбинированными, которые упаковывают в картонные пачки по 5 штук вместе с инструкцией по применению.

5. УльтраСелл-Кэт (UltraCell-Cat) следует хранить в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 2 до 8 °С.

6. Лекарственный препарат УльтраСелл-Кэт (UltraCell-Cat) следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Не использованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: УльтраСелл-Кэт (UltraCell-Cat) отпускают без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические (биологические) свойства

9. УльтраСелл-Кэт (UltraCell-Cat) относится к стимуляторам регенерации тканей.

10. Активная фармацевтическая субстанция УльтраСелл-Кэт (UltraCell-Cat) представляет собой белково-пептидный комплекс, полученный из кондиционной среды при культивировании мезенхимальных стволовых клеток кошки. Входящие в состав белково-пептидного комплекса низкомолекулярные пептиды с молекулярной массой до 10 кДа, оказывают регенерирующее и репаративное действие, стимулируя восстановление поврежденных тканей за счет активизации систем клеточного обновления организма, обеспечивая замещение поврежденных клеток.

Препарат УльтраСелл-Кэт (UltraCell-Cat) относится к малоопасным веществам и в рекомендуемых дозах не вызывает местно-раздражающего, эмбриотоксического и тератогенного действия.

III. Порядок применения

11. УльтраСелл-Кэт (UltraCell-Cat) применяют кошкам при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата (травмы связок конечностей, остеоартроз), поражений кожи неинфекционной этиологии (операционные и случайные раны, ожоги), в комплексной терапии указанных заболеваний,

осложненных инфекцией, а также в реабилитационный период после хирургических вмешательств на опорно-двигательном аппарате.

12. Противопоказанием к применению препарата УльтраСелл-Кэт (UltraCell-Cat), является повышенная чувствительность животного к компонентам препарата, аутоиммунные и онкологические заболевания.

13. При проведении лечебных мероприятий, с использованием препарата УльтраСелл-Кэт (UltraCell-Cat), следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо немедленно промыть большим количеством проточной воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом УльтраСелл-Кэт (UltraCell-Cat). В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Особенности применения препарата беременным и лактирующим самкам, а также новорожденным животным не установлено. Тем не менее, этим группам животных препарат следует применять с осторожностью, по строгим показаниям и под контролем ветеринарного врача.

15. УльтраСелл-Кэт (UltraCell-Cat) вводят кошкам парентерально: внутримышечно или подкожно, 1 раз в сутки в течение 5 дней. В случае необходимости курс лечения можно повторить через 30-45 дней.

Перед применением содержимое флакона растворяют в 1 мл стерильного 0,9 %-го раствора натрия хлорида (в комплект не входит) и нагревают в руке. При растворении препарата не следует сильно встряхивать флакон во избежание пенообразования.

Разовая доза препарата УльтраСелл-Кэт (UltraCell-Cat) (по действующему веществу) для кошек с массой тела от 0,5 до 2,5 кг составляет 0,2 мг, для кошек массой тела более 2,5 кг – 0,4 мг.

16. При применении лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. В редких случаях на месте инъекции возможны гиперемия, развитие отека, который рассасывается самопроизвольно в течение нескольких суток.

При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата и возникновении аллергических реакций, использование

УльтраСелл-Кэт (UltraCell-Cat) прекращают и проводят десенсибилизирующую терапию.

17. Симптомов передозировки при применении препарата УльтраСелл-Кэт (UltraCell-Cat) не установлено.

18. Информация о несовместимости препарата УльтраСелл-Кэт (UltraCell-Cat) с известными кормовыми добавками и лекарственными препаратами других фармакологических групп отсутствует.

19. Особенности действия при первом приеме препарата УльтраСелл-Кэт (UltraCell-Cat) или при его отмене не выявлено.

20. Следует избегать пропусков при введении очередной дозы препарата УльтраСелл-Кэт (UltraCell-Cat), так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы необходимо ввести ее как можно скорее, далее интервал между введениями препарата не изменяется.

21. Препарат не предназначен для применения продуктивным животным.

Наименование и адрес
производственной площадки
производителя лекарственного
препарата для ветеринарного
применения.

ООО «НОВИСТЕМ», 308017, г.
Белгород, ул. Константина
Заслонова, 199 Б.

Наименование, адрес организации,
уполномоченной держателем или
владельцем регистрационного
удостоверения лекарственного
препарата на принятие претензий от
потребителя

ООО «НОВИСТЕМ», 115419, г.
Москва, 2-й Рошинский проезд, д.8,
стр.5.